

LEIA COM ATENÇÃO

MATRIVAC 3[®]

Vacina Polivalente contra a Doença de Newcastle (cepa La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (cepa M41) e Doença de Gumboro (cepa Winterfield 2512)



USO VETERINÁRIO

Contém 500ml
1.000 doses

INDICAÇÕES:

MATRIVAC 3[®] é indicada para vacinação de reprodutoras leves e pesadas contra os agentes causadores da Doença de Gumboro, Doença de Newcastle e Bronquite Infecciosa das aves.

FÓRMULA:

Cada dose de vacina contém, no mínimo:

Vírus de Gumboro cepa Winterfield 2512*	10 ^{6,0} DICT ₅₀
Vírus de Newcastle cepa La Sota*	10 ^{8,0} DIE ₅₀
Vírus da Bronquite cepa M41*	10 ^{7,0} DIE ₅₀
Emulsão excipiente q.s.p.	0,5 mL

*Título mínimo antes da inativação.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5 ml/ave por via intramuscular, de preferência no músculo do peito.

A vacina pode ser aplicada em aves a partir de 3 semanas de idade, embora o mais indicado é que se vacine o mais próximo possível do início da produção de ovos, tendo já as aves recebido pelo menos uma dose de vacina viva de cada um dos agentes presentes na MATRIVAC 3[®].

PRECAUÇÕES:

1. Permitir que o produto atinja temperatura entre 15°C e 25°C para a sua aplicação.
2. Agitar bem antes e durante a vacinação.
3. Vacinar somente aves saudáveis.
4. Utilizar agulhas, seringas e equipamentos estéreis.
5. Após o término da vacinação, descartar os frascos e sobras de vacinas conforme as normas vigentes, de forma segura e em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS:

1. Se o operador aplicar a vacina em si mesmo (na mão, por exemplo) poderá haver uma reação local que em alguns casos pode ser grave. Aconselha-se em caso deste tipo de acidente, encaminhar para atendimento médico, informando que o produto contém óleo mineral em sua composição.
2. Manter o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Conservar em temperatura entre 2° C e 8° C e ao abrigo da luz solar direta. Não congelar.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.215/2018 em 01/11/2018.

Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV - MG 19.770

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**INATA**

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

READ CAREFULLY

MATRIVAC 3[®]

Polyvalente Inactivated Vaccine against the Newcastle disease (La Sota strain),
Avian Infectious Bronchitis (M41 strain), and Gumboro virus (Winterfield 2512 strain)



VETERINARY USE

Content 500mL
1.000 doses

INDICATIONS:

MATRIVAC 3[®] is indicated for vaccination of layer breeders and broiler breeders against the causative agents from the Gumboro disease, the Newcastle disease and Avian infectious bronchitis.

FORMULA:

Each dose of vaccine contains, as a minimum:

Gumboro virus (Winterfield 2512 strain)*	10 ^{6,0} DICT ₅₀
Newcastle virus (La Sota strain)*	10 ^{8,0} DIE ₅₀
Avian infectious bronchitis virus (M41 strain)*	10 ^{7,0} DIE ₅₀
Excipient emulsion q.s.p	0,5 mL

*Minimum titer before the Inactivation.

HOW TO USE:

Inoculate 0,5 ml per bird intramuscularly on the chest muscle.

The vaccine can be applied on poultry as of 3 weeks of age, although the most indicated is to vaccinate them as close as possible to the beginning of egg production, with the birds already having received at least one dose of live vaccine for each one of the causative agents included in MATRIVAC 3[®].

PRECAUTIONS:

1. Allow the product to reach a temperature between 59 °F and 77 °F for its application.
2. Shake vigorously before and during the vaccination.
3. Vaccinate only healthy birds.
4. Use sterile needle, syringes and equipment.
5. After the end of the vaccination, discard the vials and leftover vaccines in compliance with the rules in force, in a safe manner and in an appropriate location.

WARNINGS:

1. If the operator injects the vaccine on themselves (in the hand, for example), there may be a local reaction that, in some cases, may become severe. If such type of accident occurs, it is advisable to seek medical attention, informing that the product contains mineral oil in its composition.
2. Keep the product away from children and pets.

Keep at temperature between 2°C and 8°C and protected from direct sunlight. Do not freeze.

Licensed with the Ministry of Agriculture with the number 10.215/2018 em 01/11/2018.

Technical Manager: José Renato de Oliveira Branco – CRMV – MG 19.770

OWNER AND MANUFACTURER:

Inata Produtos Biológicos Ltda.
Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: +55 (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
MADE IN BRAZIL

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

DMA Group
Erbil, Kurdistan Region - Iraq
+964 750 436 3634

LEER ATENTAMENTE

MATRIVAC 3[®]

Vacuna Polivalente contra la Enfermedad de Newcastle (cepa La Sota),
Bronquitis Infecciosa Aviar (cepa M41) y Enfermedad de Gumboro (cepa Winterfield 2512)



USO VETERINARIO

Contenido 500mL
1.000 dosis

INDICACIONES:

MATRIVAC 3[®] se indica para la vacunación de reproductoras ligeras y pesadas contra los agentes causantes de la Enfermedad de Gumboro, la Enfermedad de Newcastle y la Bronquitis Infecciosa Aviar.

Cada dosis de vacuna contiene, como mínimo:

Virus de Gumboro cepa Winterfield 2512*	10 ^{6,0} DICT ₅₀
Virus de Newcastle cepa La Sota*	10 ^{8,0} DIE ₅₀
Virus de la Bronquitis cepa M41*	10 ^{7,0} DIE ₅₀
Emulsión excipiente q.s.p.	0,5 mL

*Título mínimo antes de la inactivación.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5 ml/ave por vía intramuscular, preferiblemente en el músculo del pecho.

La vacuna puede aplicarse en aves a partir de las 3 semanas de edad, aunque lo más indicado es vacunar lo más cerca posible del inicio de la producción de huevos, habiendo recibido ya las aves al menos una dosis de vacuna viva de cada uno de los agentes presentes en el MATRIVAC 3[®].

PRECAUCIONES:

1. Permitir que el producto alcance una temperatura de entre 15°C y 25°C para su aplicación.
2. Agitar bien antes y durante la vacunación.
3. Vacunar únicamente aves saludables.
4. Utilizar agujas, jeringas y equipos estériles.
5. Después de finalizar la vacunación, se deben eliminar los frascos y las sobras de vacunas conforme las normas vigentes, de forma segura y en un lugar adecuado.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales.

ADVERTENCIAS:

1. Si el operador se aplica la vacuna a sí mismo (en la mano, por ejemplo) puede producirse una reacción local que en algunos casos puede ser grave. En caso de sufrir este tipo de accidentes, es recomendable acudir a atención médica, informando que el producto contiene aceite mineral en su composición.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Conservar a una temperatura de entre 2°C y 8°C, y al abrigo de la luz solar directa. No congelar.

Certificado en el Ministerio de Agricultura con el n° 10.215/2018 em 01/11/2018.

Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV – MG 19.770

PROPIETARIO Y FABRICANTE:**INATA**

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/N° Bloco D.

Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180

CNPJ: 39.978.746/0001-00

SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:**ilender**

Ilender Bolivia S.A

KM 10 carretera al norte Urb. Las
Misiones UV. 346, Santa Cruz Bolivia
Tel.: (511) 6268300