

LEIA COM ATENÇÃO

ALEVAC 9[®]

Vacina Inativada Polivalente contra a Doença de Newcastle (cepa La Sota), Bronquite Infeciosa das Aves (cepa M41+ cepa BR1), Pneumovirose Aviária (cepa L10 - Tipo A), Síndrome da Queda de Postura - EDS (cepa CLKK1150), Coriza Infeciosa (*Avibacterium paragallinarum*, cepas 0083 + 0222 + Modesto) e Salmonelose aviária (*Salmonella Enteritidis* cepa IAL 1132)



USO VETERINÁRIO

Contém 500ml
1.000 doses**INDICAÇÕES:**

ALEVAC 9[®] é indicada para vacinação de aves de postura (espécie *Gallus gallus domesticus*) contra os agentes causadores da Doença de Newcastle, Bronquite Infeciosa das aves, Síndrome da Queda de Postura (EDS), Pneumovirose Aviária, Coriza Infeciosa e Salmonelose.

FÓRMULA:

Cada dose de 0,5 mL da vacina contém, no mínimo:

Vírus de Newcastle cepa LaSota*	10 ^{8,0} DIE ₅₀
Vírus da Bronquite cepa M41*	10 ^{7,0} DIE ₅₀
Vírus da Bronquite cepa BR1*	10 ^{5,0} DIE ₅₀
Vírus da EDS cepa CLKK1150*	500 UHA
Metapneumovírus aviário subtipo A cepa L10*	10 ^{5,0} DICT ₅₀
<i>Avibacterium paragallinarum</i> cepa 0222*	≧10 ^{8,0} UFC
<i>Avibacterium paragallinarum</i> cepa 0083*	≧10 ^{8,0} UFC
<i>Avibacterium paragallinarum</i> cepa Modesto*	≧10 ^{8,0} UFC
<i>Salmonella Enteritidis</i> cepa IAL 1132*	≧10 ^{8,0} UFC
Emulsão excipiente q.s.p.	0,5mL

*Título mínimo antes da inativação.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5 mL/ave por via intramuscular, no músculo do peito.

A vacina pode ser aplicada em aves a partir de 6 semanas de idade, embora o mais indicado é que se vacine o mais próximo possível do início da produção de ovos, tendo já as aves recebido pelo menos uma dose de vacina viva de vírus de Newcastle, Metapneumovírus e Bronquite, e uma dose de vacina inativada de coriza e *Salmonella Enteritidis*, todas elas pelo menos 3 semanas antes da administração da ALEVAC 9[®].

PRECAUÇÕES:

1. Permitir que o produto atinja temperatura entre 15°C e 25°C para a sua aplicação.
2. Agitar bem antes e durante a vacinação.
3. Vacinar somente aves saudáveis.
4. Utilizar agulhas, seringas e equipamentos estéreis.
5. Após o término da vacinação, eliminar corretamente frascos e sobras de vacina.

ADVERTÊNCIAS:

1. Se o operador aplicar a vacina em si mesmo (na mão, por exemplo) poderá haver uma reação local que em alguns casos pode ser grave. Aconselha-se em caso deste tipo de acidente, encaminhar para atendimento médico, informando que o produto contém óleo mineral em sua composição.
2. Manter o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
3. Apesar de cada partida ser liberada após ser testada em aves sensíveis de biotério, o produto poderá provocar, em alguns indivíduos, pequenas reações locais de inflamação, tais como rubor e edema até duas semanas após a vacinação.

Conservar em temperatura entre 2° C e 8° C e ao abrigo da luz solar direta. Não congelar.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.551/2023 em 16/02/2023.

Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV - MG 19.770

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA



INACTIVATED

READ CAREFULLY

ALEVAC 9®

Polyvalent Inactivated Vaccine against Newcastle Disease (La Sota strain), Infectious Bronchitis (M41 strain + BR1 strain), Avian Metapneumovirus Infection (L10 strain - Type A), Posture Drop Syndrome - EDS (CLKK1150 strain), Infectious Coryza (Avibacterium paragallinarum, 0083 + 0222 + Modesto strains), and Avian Salmonellosis (Salmonella Enteritidis IAL 1132 strain).



Content 500mL
1.000 doses

INDICATIONS:

ALEVAC 9® is indicated for the vaccination of poultry (*Gallus gallus domesticus*) against the agents responsible for Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome (EDS), Avian Pneumovirus, Infectious Coryza, and Salmonellosis.

FORMULA:

Each dose of vaccine contains, as a minimum:

Newcastle virus strain LaSota*	10 ^{8.0} DIE ₅₀
Bronchitis virus strain M41*	10 ^{7.0} DIE ₅₀
Bronchitis virus strain BR1*	10 ^{5.0} DIE ₅₀
EDS virus strain CLKK1150*	500 UHA
Avian metapneumovirus subtype A strain L10*	10 ^{5.0} DICT ₅₀
<i>Avibacterium paragallinarum</i> strain 0222*	≡ 10 ^{8.0} CFU
<i>Avibacterium paragallinarum</i> strain 0083*	≡ 10 ^{8.0} CFU
<i>Avibacterium paragallinarum</i> strain Modesto*	≡ 10 ^{8.0} CFU
<i>Salmonella Enteritidis</i> strain IAL 1132*	= 10 ^{8.0} CFU
Excipient emulsion q.s.p.	0.5 mL

*Minimum title before inactivation.

HOW TO USE:

Inoculate 0.5 mL/bird intramuscularly, into the pectoral muscle.

The vaccine can be administered to birds from 6 weeks of age, although it is recommended to vaccinate as close as possible to the start of egg production, after the birds have received at least one dose of live vaccine for Newcastle virus, Metapneumovirus, and Bronchitis, and one dose of inactivated vaccine for Coryza and Salmonella Enteritidis, all at least 3 weeks before administering ALEVAC 9®.

PRECAUTIONS:

1. Allow the product to reach a temperature between 59 °F and 77 °F for its application.
2. Shake vigorously before and during the vaccination.
3. Vaccinate only healthy birds.
4. Use sterile needle, syringes and equipment.
5. After the vaccination ends, discard correctly the vials and vaccine leftovers.

WARNINGS:

1. If the operator injects the vaccine on themselves (in the hand, for example), there may be a local reaction that, in some cases, may become severe. If such type of accident occurs, it is advisable to seek medical attention, informing that the product contains mineral oil in its composition.
2. Keep the product away from children and pets.
3. Although each batch is cleared after being tested in sensitive birds from the vivarium, the product may cause, in some individuals, small local inflammation reactions, such as redness and edema, up to two weeks after the vaccination.

Keep at temperature between 2°C and 8°C and protected from direct sunlight. Do not freeze.

Licensed with the Ministry of Agriculture with the number 10.551/2023 em 16/02/2023.
Technical Manager: José Renato de Oliveira Branco – CRMV – MG 19.770

OWNER AND MANUFACTURER:



Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: +55 (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
MADE IN BRAZIL

LEER ATENTAMENTE

ALEVAC 9[®]

Vacuna Polivalente Inactivada contra Enfermedad de Newcastle (cepa La Sota), Bronquitis Infecciosa aviar (cepa M41 + cepa BR1), Pneumovirus Aviar (cepa L10 - Tipo A), Síndrome de Caída de la Postura EDS (cepa CLKK1150), Y Coriza Infecciosa (Avibacterium paragallinarum, cepas 0083 + 0222 + Modesto)



Contenido 500mL
1.000 dosis

INDICACIONES:

ALEVAC 9[®] se indica para la vacunación de aves ponedoras (especie Gallus gallus domesticus) contra los agentes causantes de la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa en aves, Síndrome de Caída de la Postura (SED), Neumovirus Aviar, Coriza Infecciosa y Salmonelosis.

FÓRMULA:

Cada dosis de vacuna contiene, como mínimo:

Cepa del virus Newcastle LaSota*	10 ^{8.0} DIE ₅₀
Cepa del virus de la Bronquitis cepa M41*	10 ^{7.0} DIE ₅₀
Cepa del virus de la Bronquitis BR1*	10 ^{5.0} DIE ₅₀
Cepa del virus EDS CLKK1150	500 UHA
Metapneumovirus aviar subtipo A cepa L10*	10 ^{5.0} DICT ₅₀
Avibacterium paragallinarum cepa 0222*	≅ 10 ^{8.0} CFU
Avibacterium paragallinarum cepa 0083*	≅ 10 ^{8.0} CFU
AAvibacterium paragallinarum cepa Modesto*	≅ 10 ^{8.0} CFU
Salmonella Enteritidis cepa IAL 1132*	= 10 ^{8.0} CFU
Emulsión excipiente q.s.p.	0.5 mL

*Título mínimo antes de la inactivación.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5 mL/ave por vía intramuscular, en el músculo pectoral.

La vacuna se puede aplicar a aves a partir de las 6 semanas de edad, aunque lo mejor es vacunar lo más cerca posible del inicio de la producción de huevos, habiendo recibido ya las aves al menos una dosis de vacuna viva de virus Newcastle, Metapneumovirus y Bronquitis, y una dosis de vacuna inactivada contra coriza y Salmonella Enteritidis, todo al menos 3 semanas antes de la administración de la ALEVAC 9[®].

PRECAUCIONES:

1. Permitir que el producto alcance una temperatura de entre 15°C y 25°C para su aplicación.
2. Agitar bien antes y durante la vacunación.
3. Vacunar únicamente aves saludables.
4. Utilizar agujas, jeringas y equipos estériles.
5. Después de finalizar la vacunación, elimine correctamente frascos y sobras de vacuna.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales.

ADVERTENCIAS:

1. Si el operador se aplica la vacuna a sí mismo (en la mano, por ejemplo) puede producirse una reacción local que en algunos casos puede ser grave. En caso de sufrir este tipo de accidentes, es recomendable acudir a atención médica, informando que el producto contiene aceite mineral en su composición.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
3. Aunque cada lote se libera después de haber sido probado en animales sensibles en el vivero, el producto puede provocar, en algunos individuos, pequeñas reacciones locales de inflamación como enrojecimiento y edema, hasta dos semanas después de la vacunación.

Conservar a una temperatura de entre 2°C y 8°C, y al abrigo de la luz solar directa. No congelar.

Certificado en el Ministerio de Agricultura con el n° 10.551/2023 em 16/02/2023.

Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV – MG 19.770

PROPIETARIO Y FABRICANTE:



Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/N° Bloco D.

Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180

CNPJ: 39.978.746/0001-00

SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:



Ilender Bolivia S.A

KM 10 carretera al norte Urb. Las Misiones UV. 346, Santa Cruz Bolivia
Tel.: (511) 6268300