

LEIA COM ATENÇÃO

SINUVAC SE®

Vacina Inativada Polivalente contra a Coriza Infecciosa (Avibacterium paragallinarum, cepas 0083 + 0222 + Modesto) e Salmonelose aviária (Salmonella Enteritidis, cepa IAL 1132)



USO VETERINÁRIO

Contém 500ml
1.000 doses

INDICAÇÕES:

SINUVAC SE® é indicada para vacinação de aves de vida longa: reprodutoras e aves de postura (espécie Gallus gallus domesticus), contra os agentes causadores da Doença de Coriza Infecciosa das galinhas e Salmonelose.

FÓRMULA:

Cada dose de vacina contém, no mínimo:

Avibacterium paragallinarum (cepa 0083 - Sorotipo A)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (cepa 0222 - Sorotipo B)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (cepa Modesto - Sorotipo C)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Salmonella Enteritidis (cepa IAL 1132)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Emulsão excipiente q.s.p.	0,5 mL

*Título mínimo antes da inativação.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5mL/ave por via intramuscular no músculo do peito.

A vacina pode ser aplicada em aves a partir de 6 semanas de idade, embora o mais indicado é que se vacine o mais próximo possível do início da produção de ovos, tendo as aves já recebido a primeira vacinação com os agentes vacinais inativados de coriza e salmonela (a primovacinação pode ser realizada com a vacina SINUVAC SE® ou com quaisquer outras vacinas inativadas para coriza e salmonela), pelo menos 3 semanas antes da administração da SINUVAC SE®.

PRECAUÇÕES:

1. Permitir que o produto atinja temperatura entre 15°C e 25°C para a sua aplicação.
2. Agitar bem antes e durante a vacinação.
3. Vacinar somente aves saudáveis.
4. Utilizar agulhas, seringas e equipamentos estéreis.
5. Após o término da vacinação, descartar os frascos e sobras de vacinas conforme as normas vigentes, de forma segura e em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS:

1. Se o operador aplicar a vacina em si mesmo (na mão, por exemplo) poderá haver uma reação local que em alguns casos pode ser grave. Aconselha-se em caso deste tipo de acidente, encaminhar para atendimento médico, informando que o produto contém óleo mineral em sua composição.
2. Manter o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
3. Apesar de cada partida ser liberada após ser testada em aves sensíveis de biotério, o produto poderá provocar, em alguns indivíduos, pequenas reações locais de inflamação, tais como rubor e edema até duas semanas após a vacinação.

Conservar em temperatura entre 2° C e 8° C e ao abrigo da luz solar direta. Não congelar.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.484/2022 em 02/03/2022.

Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV - MG 19.770

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

INATA

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

READ CAREFULLY

SINUVAC SE®

Inactivated polyvalent vaccine against Infectious Coryza (Avibacterium paragallinarum, strains 0083 + 0222 + Modesto) and Avian Salmonellosis (Salmonella Enteritidis, strain IAL 1132)



VETERINARY USE

Content 500mL
1.000 doses

INDICATIONS:

SINUVAC SE® is indicated for the vaccination of long-lived birds: breeders and laying hens (species Gallus gallus domesticus), against the agents causing Infectious Coryza and Salmonellosis.

FORMULA:

Each dose of vaccine contains, as a minimum:

Avibacterium paragallinarum (0083 strain - Serotype A)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (0222 strain - Serotype B)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (Modesto strain Serotype C)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Salmonella Enteritidis (strain IAL 1132)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Excipient emulsion q.s.p	0,5 mL

*Minimum titer before the Inactivation.

HOW TO USE:

Inject 0.5 mL/bird via intramuscular injection in the breast muscle.

The vaccine can be applied in birds from 6 weeks of age, although the most recommended approach is to vaccinate as close as possible to the beginning of egg production, with the birds having already received the first vaccination with inactivated coryza and salmonella vaccine agents (the priming vaccination can be performed with SINUVAC SE® or any other inactivated vaccine for coryza and salmonella), at least 3 weeks before administering SINUVAC SE®.

PRECAUTIONS:

1. Allow the product to reach a temperature between 59 °F and 77 °F for its application.
2. Shake vigorously before and during the vaccination.
3. Vaccinate only healthy birds.
4. Use sterile needle, syringes and equipment.
5. After the end of the vaccination, discard the vials and leftover vaccines in compliance with the rules in force, in a safe manner and in an appropriate location.

WARNINGS:

1. If the operator injects the vaccine on themselves (in the hand, for example), there may be a local reaction that, in some cases, may become severe. If such type of accident occurs, it is advisable to seek medical attention, informing that the product contains mineral oil in its composition.
2. Keep the product away from children and pets.
3. Although each batch is cleared after being tested in sensitive birds from the vivarium, the product may cause, in some individuals, small local inflammation reactions, such as redness and edema, up to two weeks after the vaccination.

Keep at temperature between 2°C and 8°C and protected from direct sunlight. Do not freeze.

Licensed with the Ministry of Agriculture with the number 10.484/2022 em 02/03/2022.

Technical Manager: José Renato de Oliveira Branco – CRMV – MG 19.770

OWNER AND MANUFACTURER:

Inata Produtos Biológicos Ltda.
Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: +55 (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
MADE IN BRAZIL

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

Global Animal Health
Notory 9420 - Al Shomook
Business Center - UAQ FTZ
Umm Al Quwain - UAE

LEER ATENTAMENTE

SINUVAC SE®

Vacuna inactivada polivalente contra la Coryza Infecciosa (Avibacterium paragallinarum, cepas 0083 + 0222 + Modesto) y Salmonelosis aviaria (Salmonella Enteritidis, cepa IAL 1132)



USO VETERINARIO

Contenido 500mL
1.000 dosis

INDICACIONES:

SINUVAC® se indica para la vacunación de aves de postura (especie Gallus gallus domesticus) contra los agentes que causan la Enfermedad de Coriza infecciosa de las gallinas.

Cada dosis de vacuna contiene, como mínimo:

Avibacterium paragallinarum (cepa 0083 - Ser A)*	≥10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (cepa 0222 - Ser B)*	≥10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (cepa Modesto - Ser C)*	≥10 ^{8,0} UFC
Salmonella Enteritidis (cepa IAL 1132)*	≥10 ^{8,0} UFC
Emulsión excipiente q.s.p.	0,5 mL

*Título mínimo antes de la inactivación.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5 mL/ave por vía intramuscular en el músculo del pecho.

La vacuna se puede aplicar en aves a partir de 3 semanas de edad; no obstante, lo más indicado es que se vacune lo más próximo posible al comienzo de la producción de huevos, cuando las aves ya recibieron por lo menos una dosis de vacuna inactivada de oriza, todas por lo menos 4 semanas antes de la administración de SINUVAC®.

PRECAUCIONES:

1. Permitir que el producto alcance una temperatura de entre 15°C y 25°C para su aplicación.
2. Agitar bien antes y durante la vacunación.
3. Vacunar únicamente aves saludables.
4. Utilizar agujas, jeringas y equipos estériles.
5. Después de finalizar la vacunación, se deben eliminar los frascos y las sobras de vacunas conforme las normas vigentes, de forma segura y en un lugar adecuado.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales.

ADVERTENCIAS:

1. Si el operador se aplica la vacuna a sí mismo (en la mano, por ejemplo) puede producirse una reacción local que en algunos casos puede ser grave. En caso de sufrir este tipo de accidentes, es recomendable acudir a atención médica, informando que el producto contiene aceite mineral en su composición.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
3. A pesar de que cada partida se libera después de ser probada en aves sensibles de bioterio, el producto puede provocar, en algunos individuos, pequeñas reacciones locales de inflamación, como rubor y edema hasta dos semanas después de la vacunación.

Conservar a una temperatura de entre 2°C y 8°C, y al abrigo de la luz solar directa. No congelar.

Certificado en el Ministerio de Agricultura con el n° 10.484/2022 em 02/03/2022.

Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco - CRMV - MG 19.770

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/N° Bloco D.

Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180

CNPJ: 39.978.746/0001-00

SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:

Ilender Bolivia S.A

KM 10 carretera al norte Urb. Las
Misiones UV. 346, Santa Cruz Bolivia
Tel.: (511) 6268300