

LEIA COM ATENÇÃO

SINUUVAC®

Vacina Inativada Trivalente contra a Coriza Infecciosa, contendo
Avibacterium paragallinarum cepas 0083 + 0222 + Modesto



USO VETERINÁRIO

Contém 500ml
1.000 doses

INDICAÇÕES:

SINUUVAC® é indicada para vacinação de aves de postura (espécie Gallus gallus domesticus) contra os agentes causadores da Doença de Coriza Infecciosa das galinhas.

FÓRMULA:

Cada dose de vacina contém, no mínimo:

Avibacterium paragallinarum (cepa 0083 - Sorotipo A)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (cepa 0222 - Sorotipo B)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (cepa Modesto - Sorotipo C)*.....	≅10 ^{8,0} UFC
Emulsão excipiente q.s.p.	0,5 mL

*Título mínimo antes da inativação.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5mL/ave por via intramuscular no músculo do peito.

A vacina pode ser aplicada em aves com 6 semanas de idade, embora o mais indicado é que se vacine o mais próximo possível do início da produção de ovos, tendo já as aves recebido pelo menos uma dose de vacina inativada de coriza, todas elas pelo menos 3 semanas antes da administração da SINUVAC®.

PRECAUÇÕES:

1. Permitir que o produto atinja temperatura entre 15°C e 25°C para a sua aplicação.
2. Agitar bem antes e durante a vacinação.
3. Vacinar somente aves saudáveis.
4. Utilizar agulhas, seringas e equipamentos estéreis.
5. Após o término da vacinação, descartar os frascos e sobras de vacinas conforme as normas vigentes, de forma segura e em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS:

1. Se o operador aplicar a vacina em si mesmo (na mão, por exemplo) poderá haver uma reação local que em alguns casos pode ser grave. Aconselha-se em caso deste tipo de acidente, encaminhar para atendimento médico, informando que o produto contém óleo mineral em sua composição.
2. Manter o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
3. Apesar de cada partida ser liberada após ser testada em aves sensíveis de biotério, o produto poderá provocar, em alguns indivíduos, pequenas reações locais de inflamação, tais como rubor e edema até duas semanas após a vacinação.

Conservar em temperatura entre 2° C e 8° C e ao abrigo da luz solar direta. Não congelar.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.483/2022 em 02/03/2022.

Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV - MG 19.770

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

INATA

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

READ CAREFULLY

SINUUVAC®

Trivalent Inactivated Vaccine against Infectious Coryza, with
Avibacterium paragallinarum strains 0083, 0222 and Modesto



VETERINARY USE

Content 500mL
1.000 doses

INDICATIONS:

SINUUVAC® is indicated for vaccination of laying hens (species Gallus gallus domesticus) against agents that cause avian Infectious Coryza.

FORMULA:

Each dose of vaccine contains, as a minimum:

Avibacterium paragallinarum (0083 strain - Serotype A)*	≅10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (0222 strain - Serotype B)*	≅10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum (Modesto strain Serotype C)*	≅10 ^{8,0} UFC
Excipient emulsion q.s.p	0,5 mL

*Minimum titer before the Inactivation.

HOW TO USE:

Inoculate 0.5 mL / bird intramuscularly on the chest muscle

The vaccine can be applied in birds as of 3 weeks of age, although the most indicated is to vaccinate them as close as possible to the beginning of egg production, with the birds already having received at least one dose of inactivated coryza vaccine, all of them at least 4 weeks before the administration of SINUVAC®.

PRECAUTIONS:

1. Allow the product to reach a temperature between 59 °F and 77 °F for its application.
2. Shake vigorously before and during the vaccination.
3. Vaccinate only healthy birds.
4. Use sterile needle, syringes and equipment.
5. After the end of the vaccination, discard the vials and leftover vaccines in compliance with the rules in force, in a safe manner and in an appropriate location.

WARNINGS:

1. If the operator injects the vaccine on themselves (in the hand, for example), there may be a local reaction that, in some cases, may become severe. If such type of accident occurs, it is advisable to seek medical attention, informing that the product contains mineral oil in its composition.
2. Keep the product away from children and pets.
3. Although each batch is cleared after being tested in sensitive birds from the vivarium, the product may cause, in some individuals, small local inflammation reactions, such as redness and edema, up to two weeks after the vaccination.

Keep at temperature between 2°C and 8°C and protected from direct sunlight. Do not freeze.

Licensed with the Ministry of Agriculture with the number 10.483/2022 em 02/03/2022.

Technical Manager: José Renato de Oliveira Branco – CRMV – MG 19.770

OWNER AND MANUFACTURER:**INATA**

Inata Produtos Biológicos Ltda.
Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: +55 (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
MADE IN BRAZIL

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:**Global
Animal
Health**

Global Animal Health
Notory 9420 - Al Shomook
Business Center - UAQ FTZ
Umm Al Quwain - UAE

LEER ATENTAMENTE

SINUVAC®

Vacuna Inactivada Trivalente contra la Coriza Infecciosa, la cual contiene
Avibacterium paragallinarum cepas 0083, 0222 y Modesto



USO VETERINARIO

Contenido 500mL
1.000 dosis

INDICACIONES:

SINUVAC® se indica para la vacunación de aves de postura (especie Gallus gallus domesticus) contra los agentes que causan la Enfermedad de Coriza infecciosa de las gallinas.

Cada dosis de vacuna contiene, como mínimo:

Avibacterium paragallinarum (cepa 0083 - Ser A)* $\geq 10^{8,0}$ UFC

Avibacterium paragallinarum (cepa 0222 - Ser B)* $\geq 10^{8,0}$ UFC

Avibacterium paragallinarum (cepa Modesto - Ser C)* $\geq 10^{8,0}$ UFC

Emulsión excipiente q.s.p. 0,5 mL

*Título mínimo antes de la inactivación.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5 mL/ave por vía intramuscular en el músculo del pecho.

La vacuna se puede aplicar en aves a partir de 3 semanas de edad; no obstante, lo más indicado es que se vacune lo más próximo posible al comienzo de la producción de huevos, cuando las aves ya recibieron por lo menos una dosis de vacuna inactivada de oriza, todas por lo menos 4 semanas antes de la administración de SINUVAC®.

PRECAUCIONES:

1. Permitir que el producto alcance una temperatura de entre 15°C y 25°C para su aplicación.
2. Agitar bien antes y durante la vacunación.
3. Vacunar únicamente aves saludables.
4. Utilizar agujas, jeringas y equipos estériles.
5. Después de finalizar la vacunación, se deben eliminar los frascos y las sobras de vacunas conforme las normas vigentes, de forma segura y en un lugar adecuado.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales.

ADVERTENCIAS:

1. Si el operador se aplica la vacuna a sí mismo (en la mano, por ejemplo) puede producirse una reacción local que en algunos casos puede ser grave. En caso de sufrir este tipo de accidentes, es recomendable acudir a atención médica, informando que el producto contiene aceite mineral en su composición.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
3. A pesar de que cada partida se libera después de ser probada en aves sensibles de bioterio, el producto puede provocar, en algunos individuos, pequeñas reacciones locales de inflamación, como rubor y edema hasta dos semanas después de la vacunación.

Conservar a una temperatura de entre 2°C y 8°C, y al abrigo de la luz solar directa. No congelar.

Certificado en el Ministerio de Agricultura con el n° 10.483/2022 em 02/03/2022.

Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco - CRMV - MG 19.770

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

INATA

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/N° Bloco D.

Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180

CNPJ: 39.978.746/0001-00

SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:

ilender

Ilender Bolivia S.A

KM 10 carretera al norte Urb. Las
Misiones UV. 346, Santa Cruz Bolivia
Tel.: (511) 6268300