

LEIA COM ATENÇÃO

ALEVAC® 6

Vacina Inativada Polivalente contra a Doença de Newcastle (cepa La Sota),
Bronquite Infecciosa das Aves (cepa M41), Síndrome da Queda de Postura - EDS
(cepa CLKK1150) e Coriza Infecciosa (Avibacterium paragallinarum, cepas 0083 + 0222 + Modesto)



USO VETERINÁRIO

Contém 500ml
1.000 doses**INDICAÇÕES:**

ALEVAC® 6 é indicada para vacinação de aves de postura (espécie Gallus gallus domesticus) contra os agentes causadores da Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa das Aves, Síndrome da Queda de Postura (EDS) e Coriza Infecciosa.

FÓRMULA:

Cada dose de vacina contém, no mínimo:

Vírus de Newcastle cepa LaSota*	10 ^{8,0} DIE ₅₀
Vírus da Bronquite cepa M41*	10 ^{7,0} DIE ₅₀
Vírus da EDS cepa CLKK1150*	500 UHA
Avibacterium paragallinarum cepa 0222*	10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum cepa 0083*	10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum cepa Modesto*	10 ^{8,0} UFC
Emulsão excipiente q.s.p.	0,5ml

*Título mínimo antes da inativação.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5 mL/ave por via intramuscular, no músculo do peito.

A vacina pode ser aplicada em aves a partir de 6 semanas de idade, embora o mais indicado é que se vacine o mais próximo possível do início da produção de ovos, tendo já as aves recebido pelo menos uma dose de vacina viva de vírus de Newcastle e Bronquite, e uma dose de vacina inativada de coriza, todas elas pelo menos 3 semanas antes da administração da ALEVAC® 6.

PRECAUÇÕES:

1. Permitir que o produto atinja temperatura entre 15°C e 25°C para a sua aplicação.
2. Agitar bem antes e durante a vacinação.
3. Vacinar somente aves saudáveis.
4. Utilizar agulhas, seringas e equipamentos estéreis.
5. Após o término da vacinação, eliminar corretamente frascos e sobras de vacina.

ADVERTÊNCIAS:

1. Em caso de autoaplicação acidental, poderá haver uma reação local, que em alguns casos pode ser grave. Neste caso, aconselha-se buscar atendimento médico, levando consigo a embalagem do produto.
2. Manter o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
3. A eficácia do produto é garantida quando administrado de acordo com as recomendações do fabricante e não causa reações adversas. Entretanto, reações individuais de hipersensibilidade podem eventualmente ocorrer, nestes casos indica-se o tratamento sintomático.

Conservar em temperatura entre 2° C e 8° C e ao abrigo da luz solar direta. Não congelar. Após aberto, o conteúdo do frasco deverá ser completamente utilizado.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.515/2022 em 04/05/2022 Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV – MG 19.770

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

INATA

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA



INACTIVATED

READ CAREFULLY

ALEVAC® 6

Polyvalent inactivated vaccine against the Newcastle disease (La Sota strain), avian infectious bronchitis (M41 strain), egg drop syndrome - EDS (CLKK1150 strain) and infectious coryza (Avibacterium paragallinarum strains 0083, 0222 and Modesto).



VETERINARY USE

Content 500mL
1.000 doses

INDICATIONS:

ALEVAC® 6 is indicated for vaccination of laying hens (species Gallus gallus domesticus) against agents that cause Newcastle disease, Avian infectious bronchitis, Egg drop syndrome (EDS), and Infectious coryza.

FÓRMULA:

Each dose of vaccine contains, as a minimum:

Newcastle virus LaSota strain*	10 ^{8,0} DIE ₅₀
Bronchitis virus M41 strain*	10 ^{7,0} DIE ₅₀
EDS virus CLKK1150 strain*	500 UHA
Avibacterium paragallinarum 0222 strain*	10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum 0083 strain*	10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum Modesto strain*	10 ^{8,0} UFC
Excipient emulsion q.s.p	0,5ml

*Minimum titer before the inactivation

HOW TO USE:

Inoculate 0.5 mL / bird intramuscularly on the chest muscle.

The vaccine can be applied in birds as of 3 weeks of age, although the most indicated is to vaccinate them as close as possible to the beginning of egg production, with the birds already having received at least one dose of live vaccine for Newcastle and Bronchitis viroses and one dose of inactivated coryza vaccine, all of them at least 4 weeks before the administration of ALEVAC® 6.

PRECAUTIONS:

1. Allow the product to reach a temperature between 15°C and 25°C for its application.
2. Shake vigorously before and during the vaccination.
3. Vaccinate only healthy birds.
4. Use sterile needle, syringes and equipment.
5. After the vaccination ends, discard correctly the vials and vaccine leftovers.

WARNINGS:

1. If the operator injects the vaccine on themselves (in the hand, for example), there may be a local reaction that, in some cases, may become severe. If such type of accident occurs, it is advisable to seek medical attention, informing that the product contains mineral oil in its composition.
2. Keep the product away from children and pets.
3. Although each batch is cleared after being tested in sensitive birds from the vivarium, the product may cause, in some individuals, small local inflammation reactions, such as redness and edema, up to two weeks after the vaccination.

Keep at temperature between 2°C and 8°C and protected from direct sunlight. Do not freeze.

Licensed with the Ministry of Agriculture with the number 10515 on 05/04/2022 Technical Manager: José Renato de Oliveira Branco – CRMV - MG 19.770

OWNER AND MANUFACTURER:



INATA

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

LEER ATENTAMENTE

ALEVAC® 6

Vacuna inactivada polivalente contra la Enfermedad de Newcastle (cepa La Sota), Bronquitis infecciosa de las aves (cepa M41), Síndrome de caída de postura - EDS (cepa CLKK1150) y Coriza infecciosa (Avibacterium paragallinarum, cepas 0083,0222 y Modesto).



USO VETERINARIO

Contenido 500mL
1.000 dosis**INDICACIONES:**

ALEVAC® 6 se indica para la vacunación de aves de postura (especie Gallus gallus domesticus) contra los agentes que causan la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis infecciosa de las aves, Síndrome de caída de postura (EDS) y Coriza infecciosa.

FÓRMULA:

Cada dosis de vacuna contiene, como mínimo:

Virus de Newcastle cepa La Sota*	10 ^{8,0} DIE ₅₀
Virus de la bronquitis cepa M41*	10 ^{7,0} DIE ₅₀
Virus de EDS cepa CLKK1150*	500 UHA
Avibacterium paragallinarum cepa 0222*	10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum cepa 0083*	10 ^{8,0} UFC
Avibacterium paragallinarum cepa Modesto*	10 ^{8,0} UFC
Emulsión excipiente q.s.p.	0,5ml

* Título mínimo antes de la inactivación.

MODO DE USAR:

Inocular 0,5 mL/ave por vía intramuscular en el músculo del pecho.

La vacuna se puede aplicar en aves a partir de 3 semanas de edad; no obstante, lo más indicado es que se vacune lo más próximo posible al comienzo de la producción de huevos, cuando las aves ya recibieron por lo menos una dosis de vacuna viva del virus de Newcastle y de la bronquitis, y una dosis de vacuna inactivada de coriza, todas por lo menos 4 semanas antes de la administración de ALEVAC® 6.

PRECAUCIONES:

1. Permitir que el producto alcance una temperatura de entre 15°C y 25°C para su aplicación.
2. Agitar bien antes y durante la vacunación.
3. Vacunar únicamente aves saludables.
4. Utilizar agujas, jeringas y equipos estériles.
5. Después de finalizar la vacunación, elimine correctamente frascos y sobras de vacuna.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales.

ADVERTÊNCIAS:

1. Si el operador se aplica la vacuna a sí mismo (en la mano, por ejemplo), puede haber una reacción local que en algunos casos puede ser grave. Ante este tipo de accidente, se aconseja encaminar a la atención médica e informar que el producto contiene aceite mineral en su composición.
2. A pesar de que cada partida se libera después de ser probada en aves sensibles de bioterio, el producto puede provocar, en algunos individuos, pequeñas reacciones locales de inflamación, como rubor y edema hasta dos semanas después de la vacunación.

Conservar a una temperatura de entre 2°C y 8°C, y al abrigo de la luz solar directa. No congelar.

Certificado en el Ministerio de Agricultura con el N.º 10515 el 04/05/2022 Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco - CRMV-MG nº 19770

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

INATA

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.

Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180

CNPJ: 39.978.746/0001-00

SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:

ilender

Ilender Bolivia S.A

KM 10 carretera al norte Urb. Las
Misiones UV. 346, Santa Cruz Bolivia
Tel.: (511) 6268300